

消化器112**<化学療法予約箋>**

プロトコール名	アバステン XELIRI
病名	

プロトコール

薬品名	成分名	基準値	施行日	休薬
アバステン	ベバシズマブ	7.5 mg/kg/day	Day1	20日
ゼローダ	カペシタビン	1600 mg/m ² /day	2週間連日投与	7日
イリノテカン	イリノテカン	200 mg/m ² /day	Day1	20日

<3週毎 1クール>

	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目
施行日						

- ①(メイン)生食 50mL ルート確保(ルート確保後、フラッシュ分残す)
- ②(側管)生食 100mL + パロノセトロン 0.75mg 1V+ オルガドロン 1.9mg × 4A (30分)
- ③(側管)生食 100mL + アバステン()分) * 下記表にて投与時間確認
- ※初回90分で忍容性あれば、2回目60分、忍容性あれば3回目30分まで短縮可能。以降の投与は30分**
- ④(側管)5%ブドウ糖液 500mL + イリノテカン (90分)
- ⑤(メイン)①の生食 50mLの残液でフラッシュ (全開)

*** イリノテカン投与中にコリン作動性の症状(腹痛、下痢、嘔気、多量発汗など)あれば
イリノテカン投与前に、硫酸アトロピンかブスコパン投与**

※患者の症状に応じてイメンド追加

備考

--