

<外化学療法予約箋>

プロトコール名	ベクティビックス FOLFOX4療法
病名	

プロトコール

薬品名	成分名	基準値	施行日	休薬
ベクティビックス	パニツムマブ	6 mg/kg/day	Day 1	13日
エルプラット	オキサリプラチン	85 mg/m ² /day	Day 1	12日
5-FU	フルオロウラシル	400mg/m ² /day(bolus) 600mg/m ² /day(infusion)	Day 1,2	
レボホリナート	レボホリナートカルシウム	100 mg/m ² /day	Day 1,2	
2週毎に				

	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目
施行日						

第1日目

①<メイン>グラニセトロンバッグ+ オルガドロン(1.9mg) ×4A 30分 *末梢の場合ルート確保

②<メイン>生食 100mL + ベクティビックス (60分) "

*ベクティビックスはインラインフィルター(0.2~0.22ミクロン)を用いて投与すること

③<メイン> 5%ブドウ糖 250mL + エルプラット (2時間)

③ <側管> 5%ブドウ糖 250mL +レボホリナート (2時間)

*エルプラット7回目以降は、5分、10分、20分、30分、60分、90分、終了時観察

④レボホリナート終了後<メイン> 5%ブドウ糖 50mL + 5-FU (全開)

⑤5-FU全開後<メイン> KN3号 500mL + 5-FU 22時間かけて持続点滴

第2日目

①<メイン> 5%ブドウ糖 250mL + レボホリナート (2時間)

②<メイン> 5%ブドウ糖 50mL + 5-FU 全開

③5-FU全開後<メイン> KN3号 500mL + 5-FU 22時間かけて持続点滴

④抜針前に生食 50mLでフラッシュ (全開)

注意:ベクティビックスは1000mg超えるときは生食150mL必要となります(90分点滴)