

消化器223

<化学療法予約箋>

プロトコール名	初回 アービタックス FOLFIRI (IVH)療法
病名	

プロトコール

薬品名	成分名	基準値	施行日	休薬
アービタックス	セツキシマブ	400 mg/m ² /day	Day 1	6日
アービタックス	セツキシマブ	250 mg/m ² /day	Day 8	
イリノテカン	イリノテカン	150 mg/m ² /day	Day 1	13日
5-FU	フルオロウラシル	400mg/m ² (bolus)	Day 1	
		2400mg/m ² (infusion)	Day 1(46hr)	
レボホリナート	レボホリナートカルシウム	200 mg/m ² /day	Day 1	

2週毎に

	1コース目
施行日DAY1	
施行日DAY8	

第1日目

- ①<メイン>グラニセトロンバッグ+ オルガドロン(1.9mg) × 4A +ポララミン1A (30分)
 - ②<メイン>生食 500mL + アービタックス (120分) *5分、10分、20分、30分、60分、90分、終了時観察
 - ③<メイン>生食 50mL 投与 (60分)
- 60分経過観察
- ④<メイン>5%ブドウ糖 250mL + イリノテカン(90分) *5分、10分、20分、30分、60分、終了時観察
 - ④<側管> 5%ブドウ糖 250mL + レボホリナート(120分)
- レボホリナート終了後
- ⑤<メイン>5%ブドウ糖 50mL + 5-FU(全開)
 - ⑥<メイン>生食 + 5-FU 46時間かけて持続点滴

* イリノテカン投与中にコリン作動性の症状(腹痛、下痢、嘔気、多量発汗など)あれば
イリノテカン投与前に、硫酸アトロピンかブスコパン投与

第8日目

- ①(メイン) 生食50mL にてルート確保
 - ②(側管)生食 100mL + オルガドロン(1.9mg) × 4A+ポララミン1A (30分)
 - ③(側管)生食 250mL + アービタックス (60分)
 - ④①の生食 50mLの残液でフラッシュ (30分)
- 30分経過観察

備考

主治医		指導医		看護師		薬剤師	予約受取	確認1	確認2	入力
-----	--	-----	--	-----	--	-----	------	-----	-----	----