

# 消化器225

## <化学療法予約箋>

プロトコール名	初回 アービタックス+イリノテカン
病名	

プロトコール

薬品名	成分名	基準値	施行日	休薬
アービタックス	セツキシマブ	400 mg/m <sup>2</sup> /day	Day 1	6日
アービタックス	セツキシマブ	250 mg/m <sup>2</sup> /day	Day 8	
イリノテカン	イリノテカン	150 mg/m <sup>2</sup> /day	Day 1	13日

2週毎に

	1コース目
施行日DAY1	
施行日DAY8	

### 第1日目

- ①(メイン) 生食50mL(ルート確保後フラッシュ分残す)
  - ②(側管) グラニセトロンバッグ+ オルガドロン(1.9mg) × 4A +ポララミン1A (30分)
  - ③(側管) 生食 500mL + アービタックス (120分) \*5分、10分、20分、30分、60分、90分、終了時観察
  - ④(側管) 生食 50mL 投与 (60分)
- 60分経過観察
- ⑤(側管) 5%ブドウ糖 250mL + イリノテカン(90分) \*5分、10分、20分、30分、60分、終了時観察
  - ⑥①生食50mLの残液でフラッシュ(全開)

\* イリノテカン投与中にコリン作動性の症状(腹痛、下痢、嘔気、多量発汗など)あれば  
イリノテカン投与前に、硫酸アトロピンかブスコパン投与

### 第8日目

- ①(メイン) 生食50mL にてルート確保
  - ②(側管) 生食 100mL + オルガドロン(1.9mg) × 4A +ポララミン1A (30分)
  - ③(側管) 生食 250mL + アービタックス (60分)
  - ④①の生食 50mLの残液でフラッシュ (30分)
- 30分経過観察

備考

--