

消化器226

<化学療法予約箋>

プロトコール名	アービタックス・イリノテカン療法(2週間隔) 2クール以降
病名	

プロトコール

薬品名	成分名	基準値	施行日	休薬
アービタックス	セツキシマブ	250mg/m ²	Day1.8	6日
イリノテカン	塩酸イリノテカン	150mg/m ²	Day1	

	Day1	Day8
アービタックス		
イリノテカン		

Day1

- ①(メイン)生食 50ml にてルート確保(点滴挿入確認後、点滴終了後のフラッシュ分残す)
 - ②(側管)グラニセトロンバッグ + オルガドロン 1.9mg × 4A+ポララミン1A (30分)
 - ③(側管)生食 250mL + アービタックス (60分)
 - ④生食50ml フラッシュ(30分)
- 30分経過観察
- ⑤(側管)5%糖液 250mL + イリノテカン (90分)
 - ⑥ ①の生食50mlの残液でフラッシュ(全開)

*** イリノテカン投与中にコリン作動性の症状(腹痛、下痢、嘔気、多量発汗など)あれば、イリノテカン投与前に、硫酸アトロピンかブスコパン投与**

Day8

- ①(メイン)生食 50ml にてルート確保(点滴挿入確認後、点滴終了後のフラッシュ分残す)
 - ②(側管)生食 100mL + オルガドロン 1.9mg × 4A+ポララミン1A (30分)
 - ③(側管)生食 250mL + アービタックス (60分)
 - ④①の生食50mlの残液でフラッシュ(全開)
- 30分経過観察

備考