

プロトコール名	キイトルーダ+CBDCA+nabPTX療法
病名	非小細胞癌

プロトコール

薬品名	成分名	基準値	施行日
キイトルーダ	ペムブロリズマブ	200mg/body	Day1
カルボプラチン	カルボプラチン	AUC= 6	Day 1
アブラキサン	パクリタキセル	100 mg/m ²	Day1.8.15
			3週毎

施行日	DAY1	DAY8	DAY15
キイトルーダ			
カルボプラチン			
アブラキサン			
		フローズングローブ使用	

アブラキサン血液製剤
ロット入力が必要

Day 1

- ①(メイン)生食50mL(ルート確保後フラッシュ分残す)
- ②(側管)生食100mL+キイトルーダ 200mg (8mL) 点滴静注 (30分)
※インラインフィルター(0.2~5 μ m)を使用すること
- ③(メイン)生食250ml <60分> *プロイメンドによる血管炎予防のため同時に流す
- ③(側管)グラニセトロンバック3mg/100mL + プロイメンド1V+オルガドロン(1.9mg) 4A <60分>
*アブラキサン15分前~フローズングローブ・ソックス装着
- ④(側管)生食(1Vあたり生食20mL)+ アブラキサン <30分> *5分、10分、終了時観察
*アブラキサンのルートフィルター不可 DEHP(可塑剤)フリーのルート使用
- ⑤(側管)生食 50mL <15分>
*フローズングローブ・ソックスはずす
- ⑥(側管)5%ブドウ糖液 250mL + カルボプラチン <60分で>
- ⑦(メイン)①生食の残液でフラッシュ(全開)

Day 8

Day 15

- ①(メイン)生食50mL(ルート確保後フラッシュ分残す)
- ②(側管)生食100mL + オルガドロン(1.9mg) 4A <30分>
*アブラキサン15分前~フローズングローブ・ソックス使用装着
- ③(側管)生食(1Vあたり生食20mL)+ アブラキサン <30分> *5分、10分、終了時観察
*アブラキサンのルートフィルター不可
- ④①生食50mLの残液でフラッシュ(③と同速度)

備考

--