

# 呼吸器内科112 <化学療法予約箋>

プロトコール名	キイトルーダ+CDDP+PEM 併用療法
病名	

## プロトコール

薬品名	成分名	基準値	施行日	休薬
キイトルーダ	ペムプロリズマブ	200 mg/body	DAY 1	20日
シスプラチン	シスプラチン	75 mg/m <sup>2</sup> /day		
アリムタ	ヘマトレキセトナトリウム水和物	500 mg/m <sup>2</sup> /day		
			3週毎	

施行日	

1週間前(DAY -7) パンビタン末 1g/日 内服開始

(最終投与1ヶ月後まで投与を継続すること)

1週間前 フレスミン1Aまたはメチコバル500μg 2A筋注 (9週ごと)

DAY 1

①(メイン) 生食50mL (ルート確保後、フラッシュ分残す)

②(側管) 生食100mL + キイトルーダ200mg (8mL) 点滴静注 30分

**※インラインフィルター(0.2~5μm)を使用すること**

③(側管) KN1号 500mL + アスパラギン酸カリウム10mL (K 10mEq) + 硫酸マグネシウム10mL (Mg 10mEq) <60分で>

④(側管) 生食 250mL + プロイメンド1V + アロキシ(0.75mg) 1V + オルガドロン(1.9mg) 4A <60分で>

⑤(側管) 生食 100mL + アリムタ mg (500mg/m<sup>2</sup>) <10分で>

(必ず10分で滴下すること!)

⑥(側管) マンニトール 300mL <45分で>

⑦(側管) 生食 500mL + シスプラチン mg <60分で>

⑧(側管) KN1号 500mL + アスパラギン酸カリウム10mL (K 10mEq) <60分で>

⑨①生食50mLの残液でフラッシュ(全開)

\* アリムタ投与前後5日間はNSAIDsの服用回避が望ましい

DAY 1~3

~

経口にて1日1000mL以上の飲水を行う。(可能であれば経口補水液 OS-1)

DAY 2~3

~

Day2よりデカドロン(0.5mg) 16錠/朝食後 を2日間内服。

備考  
登録

--	--