

プロトコール名	テセントリク+アバスチン TXL(monthly)-CBDCA(末梢)
病名	

プロトコール

薬品名	成分名	基準値	施行日	休薬
テセントリク	アテゾリズマブ	1200mg/body	Day1	20日
アバスチン	ペハシスマブ	15 mg/kg/day		
パクリタキセル	パクリタキセル	200 mg/m ² /day		
カルボプラチン	カルボプラチン	AUC = 6		
			3週毎	

施行日	
-----	--

①(メイン)生食250ml(点滴挿入確保後、フラッシュ分残す)

②(側管)生食250mL+テセントリク1200mg(20mL)点滴

※インラインフィルター(0.2または0.22 μ m)を使用すること

初回60分で投与。初回60分投与の忍容性有れば、2回目以降の投与時間は30分まで短縮可能

③(側管)生食50mL(全開)

④(側管)生食 100ml + アバスチン

※初回90分で忍容性あれば、2回目60分、忍容性あれば
3回目30分まで短縮可能。以降の投与は30分

⑤①生食をプロイメンドと同時に150mL/hで流す(残液残す)

⑥(側管)グラニセトロン + オルガドロン(19mg) 1V + ファモチジン(20mg) 1A + プロイメンド1V + ポララミン1A (60分)

パクリタキセル開始15分前からフローズングローブ・ソックス開始

⑦(側管)生食 500ml + パクリタキセル mg(200mg/m²) <180分で>

DEHP(可塑剤)フリーインラインフィルター付きのルート使用

パクリタキセル 開始後バイタルチェック 0,5,10,30,60,120,180分

⑧(側管)5% TZ 250ml + カルボプラチン <60分で> パクリタキセル終了15分後フローズングローブ・ソックス終了

⑨①生食残薬でルートフラッシュ (全開)

備考

--