

呼吸器内科402 <化学療法予約箋>

プロトコール名	BEV+PEM療法
病名	

プロトコール

薬品名	成分名	基準値		単位	施行日	休薬
アバスタチン	ペバシスマブ	7.5	or	15	mg/kg/day	day1 20日
アリムタ	ペメトレキセド	500		mg/m ² /day		
3週毎						

施行日	
-----	--

1週間前(DAY -7) パンビタン末 1g/日 内服開始
 (最終投与1ヶ月後まで投与を継続すること)
 1週間前 フレスミン1Aまたはメチコバル500 μg 2A筋注 (9週ごと)

DAY 1

- ①(メイン)生食50mL (ルート確保、フラッシュ分残す)
 - ②(側管)生食 100mL + アバスタチン ()分 * 下記表にて投与時間確認
- ※初回90分で忍容性有れば、2回目60分、忍容性有れば3回目30分まで短縮可能
以降の投与は30分
- ③(側管)生食100mL + オルガドロン (1.9mg) 4A <30分>
 - ④(側管)生食 100mL + アリムタ mg(500mg/m²) <10分>
 (必ず10分で滴下すること) DEHP(可塑剤)freeのルート使用
 - ⑤①生食の残液でフラッシュ(全開)

* アリムタ投与前後5日間はNSAIDsの服用回避が望ましい

備考