血液内科-11

プロトコール名	(3~8コース)BD療法(寛解導入療法)
病名	多発性骨髄腫

プロトコール

薬品名	成分名	基準値		基準値		施行日	休薬
ベルケイド	ボルテゾミブ	1.3 mg/m²/day		Day1.4.8.11	10日		
オルガドロン	リン酸デキサメタゾンNa	20	mg/day	Day1.2.4.5	16日		

3週毎 最大8コースまで

コース目

施行日	Day1	Day4	Day8	Day11
ベルケイド				

<day1.4></day1.4>	Day1	Day4

- ① 生食1.2ml + ベルケイド mg 皮下注射 (生食1.2mlで溶解し2.5mg/mlの調整液とする)
- ② 生食100mg + オルガドロン19mg 1V + オルガドロン1.9mg 0.5A 点滴静注(30分)

<day2.5></day2.5>	Day2		Day5	
(1) H-4100		10	<u> </u>	 上法

① 生食100mg + オルガドロン19mg 1V + オルガドロン1.9mg 0.5A 点滴静注(30分)

<day8.11></day8.11>	Day8		Day11	
① 生食1.2ml +	ベルケイド m	g 皮下	注射	
/ II A				

(生食1.2mlで溶解し2.5mg/mlの調整液とする)

備考			