

# 血液内科 16

プロトコール名 (同日投与)R CHOP療法

プロトコール

| 薬品名        | 成分名       | 基準値                        | 施行日     | 休薬  |
|------------|-----------|----------------------------|---------|-----|
| リツキサン      | リツキシマブ    | 375 mg/m <sup>2</sup> /day | Day1    | 13日 |
| プレドニン      | プレドニゾン    | 100 mg/body                | Day 1-5 | 9日  |
| ドキシルビシン塩酸塩 | 塩酸ドキシルビシン | 50 mg/m <sup>2</sup> /day  | Day 1   | 13日 |
| オンコビン      | 硫酸ビンクリスチン | 1.4 mg/m <sup>2</sup> /day |         |     |
| エンドキサン     | シクロホスファミド | 750 mg/m <sup>2</sup> /day |         |     |

< 2週 1クール >

| 施行日        | Day 1 |
|------------|-------|
| リツキサン      |       |
| ドキシルビシン塩酸塩 |       |
| オンコビン      |       |
| エンドキサン     |       |

## Day 1-5

プレドニン(5mg) 2錠(朝 10錠・昼 10錠)を5日間内服

## Day 1

アセトアミノフェン(200mg)2錠 レボセチリジン5mg 1錠 内服(30待機)

① (メイン) 生食 500 mL + リツキサン mg 点滴静注

### リツキサンの点滴速度

I 開始後1時間 (ml/時間)

II 開始後1時間から2時間(1時間) (ml/時間)

III 開始後2時間以降 (ml/時間)

② (メイン) 生食 500mLにてルートキープ

③ (側管) グラニセトロンバック100ml 30分かけて点滴静注

④ (側管) 生食 100mL + ドキシルビシン塩酸塩 mg 30分かけて点滴静注

⑤ (側管) 生食 50mL + オンコビン mg 15分かけて点滴静注

⑥ (側管) 生食 500mL + エンドキサン mg 2時間かけて点滴静注

備考

|  |
|--|
|  |
|--|