

血液内科 30

プロトコール名	CHASER
---------	--------

プロトコール

薬品名	成分名	基準値	施行日	休薬
リツキサン	リツキシマブ	375 mg/m ² /day	Day1	20日
オルガドロン	リン酸デキサメタゾンNa	40 mg/day	Day 2.3.4	17日
エトポシド	エトポシド	100 mg/m ² /day		
キロサイド	シタラピン	2000 mg/m ² /day	Day 3.4	17日
エンドキサン	シクロホスファミド	1200 mg/m ² /day	Day2	19日

< 3週 1クール >

施行日	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4
リツキサン				
エトポシド				
キロサイド				
エンドキサン				

Day1

アセトアミノフェン(200mg)2錠 レボセチリジン5mg 1錠 内服(30待機)

- ①(メイン) 生食250mL (ルート確保後フラッシュ分残す)
- ②(側管) 生食 500 mL + リツキサン mg 点滴静注

リツキサンの点滴速度
I 開始後1時間 (ml/時間)
II 開始後1時間から2時間(1時間) (ml/時間)
II 開始後1時間から2時間(1時間) (ml/時間)

- ③(メイン) ①生食出フラッシュ(全開)

Day2

- ①(メイン) 生食 500ml ルートキープ
- ②(側管) グラニセトロンバック3mg 100ml (30分)
- ③(側管) 生食100mL + オルガドロン19mg 2V (30分)
- ④(側管) 生食 500 mL + エンドキサン mg 点滴静注 (120分)
- ⑤(側管) 5%ブドウ糖液 500 mL + エトポシド mg 点滴静注 (120分)

Day3

Day4

- ①(メイン) 生食 500ml ルートキープ
- ②(側管) グラニセトロンバック3mg 100ml (30分)
- ②(側管) 生食100mL + オルガドロン19mg 2V (30分)
- ③(側管) 5%ブドウ糖液 250 mL + キロサイド mg 点滴静注 (180分)
- ④(側管) 5%ブドウ糖液 500 mL + エトポシド mg 点滴静注 (120分)

備考

--