

血液内科 47

プロトコール名 mLSG15 療法

プロトコール

| 薬品名 | 成分名 | 基準値 | 施行日 | 休薬 |
|----------------|-------------|----------------------------|---------------|-----|
| プレドニン | プレドニゾン | 40 mg/m ² /day | Day 1、8、15-17 | 11日 |
| オンコピン | ピンクリスチン硫酸塩 | 1 mg/m ² /day | Day 1 | 27日 |
| エンドキサン | シクロホスファミド | 350 mg/m ² /day | | |
| ドキシソルピシン(Day1) | ドキシソルピシン塩酸塩 | 40 mg/m ² /day | | |
| ドキシソルピシン(Day8) | ドキシソルピシン塩酸塩 | 30 mg/m ² /day | Day8 | 20日 |
| サイメリン | ラニムスチン | 60 mg/m ² /day | | |
| フィルデシン | ビンデシン硫酸塩 | 2.4 mg/m ² /day | Day15 | 13日 |
| エトポシド | エトポシド | 100 mg/m ² /day | Day15-17 | 11日 |
| カルボプラチン | カルボプラチン | 250 mg/m ² /day | Day15 | 13日 |

< 4週 1クール > 6クールまで

| 施行日 | Day 1 | Day 8 | Day 15 | Day 16 | Day 17 |
|----------------|-------|-------|--------|--------|--------|
| プレドニン | ■ | | | | |
| オンコピン | ■ | | | | |
| エンドキサン | ■ | | | | |
| ドキシソルピシン(Day1) | ■ | | | | |
| ドキシソルピシン(Day8) | | ■ | | | |
| サイメリン | | ■ | | | |
| フィルデシン | | | ■ | | |
| エトポシド | | | ■ | ■ | ■ |
| カルボプラチン | | | ■ | | |

Day1 Day8 Day15~17 ~

プレドニン mg 内服

② (側管) グラニセトロンバック 3mg/100mL 30分

Day1

- ③ (側管) 生食 50mL + オンコピン mg 点滴静注 15分 遮光袋かける (Max 2mgまで)
- ④ (側管) 生食 50mL + ドキシソルピシン mg 点滴静注 15分
- ⑤ (側管) 生食 250mL + エンドキサン mg 点滴静注 2時間
- ⑥ ①の生食の残液でフラッシュする (⑤と同速度)

Day8

- ③ (側管) 生食 50mL + ドキシソルピシン mg 点滴静注 15分
- ④ (側管) 5%ブドウ糖 250mL + サイメリン mg 点滴静注 1時間
- ⑤ ①の生食の残液でフラッシュする (④と同速度)

Day15

- ③ (側管) 生食 50mL + フィルデシン mg 点滴静注 15分 遮光袋かける
- ④ (側管) 5%ブドウ糖 250mL + エトポシド mg 点滴静注 2時間
- ⑤ (側管) 5%ブドウ糖 250mL + カルボプラチン mg 点滴静注 2時間
- ⑥ ①の生食の残液でフラッシュする (⑤と同速度)

Day16

Day17

- ③ (側管) 5%ブドウ糖 250mL + エトポシド mg 点滴静注 2時間
- ④ ①の生食の残液でフラッシュする (③と同速度)

備考

| |
|--|
| |
|--|