

血液内科 58

プロトコール名 ESHAP療法

プロトコール

薬品名	成分名	基準値	施行日	休薬
エトポシド	エトポシド	40 mg/m ² /day	Day 1、2、3、4	17日
シスプラチン	シスプラチン	25 mg/m ² /day	Day 1、2、3、4	17日
キロサイド	シタラビン	2000 mg/m ² /day	Day 5	16日

< 3週 1クール >

施行日	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5
エトポシド					
シスプラチン					
キロサイド					

Day1

Day2

Day3

Day4

- ① (メイン) 生食 1000mL + マグネゾール1A 点滴静注 3時間
- ② (側管1) グラニセトロンバック3mg/100mL 30分
- ③ (側管1) 生食 250mL + エトポシド mg 点滴静注 1時間
- ④ (側管2) 生食 500mL + シスプラチン mg 持続点滴 24時間

シスプラチンに遮光袋かける

- ⑤ (メイン) 生食 1000mL (翌日のケモ開始までキープ)

Day5

- ① (メイン) 生食 1000mL + マグネゾール1A 点滴静注 3時間
- ② (側管1) グラニセトロンバック3mg/100mL 30分
- ⑤ (側管1) 生食 500mL + キロサイド mg 点滴静注 2時間

※ Day1 イメンド 125mg 1C内服

※ Day2、3 イメンド 80mg 1C内服 (必要に応じてDay4、5も追加)

※ Day5、6の2日間 1日4回 ステロイド点眼(0.1%フルメトロン点眼液)を行う

備考

--