

血液内科 65

プロトコール名 (1~3クール目)DBd

プロトコール

薬品名	成分名	基準値	施行日	休業
ダラザレックス	ダラツムマブ	16 mg/Kg/day	Day 1、8、15	6日
ベルケイド	ボルテゾミブ	1.3 mg/m ² /day	Day 1、4、8、11	10日
レナデックス・オルガドロン	デキサメタゾン	80 mg/week	Day1、2、4、5、8、9、11、12	9日

< 3週 1クール >

施行日	Day 1	Day 4	Day 8	Day 11	Day15
ダラザレックス					
ベルケイド					

Day1

- ①アセトアミノフェン200mg 2錠 + レボセチリジン5mg 1錠 (ダラザレックス投与1時間前内服) *内服後すぐに点滴スタート
- ①生食250mlにてルート確保 (点滴挿入後、フラッシュ分残す)
- ②(側管) 生食100mL + オルガドロン19mg 1V (ダラザレックス投与1時間前に開始) (30分)
- ③(側管) 生食50ml (30分)
- ④(側管) 生食 1000mL + ダラザレックス * 下記表にて投与時間確認
* インラインフィルター(0.2μm)を通して投与すること
- ⑤ ①の生食250ml残液でルートを流す(全開)
- ⑥ ベルケイド mg 皮下注
(ベルケイド3mg1Vを生食1.2mLで溶解 2.5mg/mL)

Day4

Day11

レナデックス 錠内服

- ① ベルケイド mg 皮下注
(ベルケイド3mg1Vを生食1.2mLで溶解 2.5mg/mL)

Day8

- ①アセトアミノフェン200mg 2錠 + レボセチリジン5mg 1錠 (ダラザレックス投与1時間前内服) *内服後すぐに点滴スタート
- ①生食250mlにてルート確保 (点滴挿入後、フラッシュ分残す)
- ②(側管) 生食100mL + オルガドロン19mg 1V (ダラザレックス投与1時間前に開始) (30分)
- ③(側管) 生食50ml (30分)
- ④(側管) 生食 500mL + ダラザレックス * 下記表にて投与時間確認
* インラインフィルター(0.2μm)を通して投与すること
- ⑤ ①の生食250ml残液でルートを流す(全開)
- ⑥ ベルケイド mg 皮下注
(ベルケイド3mg1Vを生食1.2mLで溶解 2.5mg/mL)

Day15

- ①アセトアミノフェン200mg 2錠 + レボセチリジン5mg 1錠 (ダラザレックス投与1時間前内服) *内服後すぐに点滴スタート
- ①生食250mlにてルート確保 (点滴挿入後、フラッシュ分残す)
- ②(側管) 生食100mL + オルガドロン19mg 1V (ダラザレックス投与1時間前に開始) (30分)
- ③(側管) 生食50ml (30分)
- ④(側管) 生食 500mL + ダラザレックス * 下記表にて投与時間確認
* インラインフィルター(0.2μm)を通して投与すること
- ⑤ ①の生食250ml残液でルートを流す(全開)

Day2、5、9、12

レナデックス 錠 内服

ダラザレックスの投与速度

投与時期	希釈後の総量	投与開始からの投与速度(mL/時)			
		0~1時間	1~2時間	2~3時間	3時間以降
Day1	1000mL				
Day8	500mL				
Day15以降	500mL				

備考

--