

<化学療法予約箋>

プロトコール名	(初回)トラスツズマブ ナベルビン療法
病名	乳癌

プロトコール

薬品名	成分名	基準値	施行日	休薬
トラスツズマブ	トラスツズマブ	4 mg/Kg/day	Day1	6日
トラスツズマブ	トラスツズマブ	2 mg/Kg/day	Day8.15	
ナベルビン	酒石酸ヒルルビン	25 mg/m ² /day	Day1.8	13日

<3週毎>

	DAY1	DAY8	DAY15
施行日			

DAY1

- ①(メイン)5%ブドウ糖 250ml (全開)にてルート確保 (点滴挿入確認後、フラッシュ分残す)
- ②(側管) 生食250ml + トラスツズマブ (90分) *5分、10分、20分、30分、60分、終了時観察
- ③(側管) 生食100ml + オルガドロン 1.9mg×4A (30分)
ナベルビン開始15分前からフローズングローブ・ソックス使用
- ④(側管) 生食 50ml + ナベルビン 10分以内で滴下 *5分、終了時観察
ナベルビン終了15分後フローズングローブ・ソックスはずす
- ⑤①残液にてフラッシュ (全開)

DAY8

- ①(メイン)5%ブドウ糖 250ml にてルート確保 (点滴挿入確認後、フラッシュ分残す)
- ②(側管) 生食250ml +トラスツズマブ (分) * 投与時間確認
- ③(側管) 生食 100ml + オルガドロン 1.9mg×4A 点滴静注 30分
ナベルビン投与開始15分前フローズングローブ・ソックス使用
- ④(側管) 生食 50ml + ナベルビン 10分以内
ナベルビン投与15分後フローズングローブ・ソックスはずす
- ⑤①残液にてフラッシュ (全開)

DAY15

- ①(メイン)生食50mlにてルート確保 (点滴挿入確認後、フラッシュ分残す)
- ②(側管) 生食250ml +トラスツズマブ (分) * 投与時間確認
- ③ ①の生食50mlの残液でフラッシュ (全開)

* トラスツズマブ投与時間；忍容性あれば2回目以降は30分まで短縮可

備考

--