

# <化学療法予約箋>

プロトコール名	アバスチン + パクリタキセル療法
病名	乳がん

プロトコール

薬品名	成分名	基準値	施行日	休薬
アバスチン	ベパシズマブ	10 mg/Kg/day	Day1.15	13日
パクリタキセル	パクリタキセル	80 mg/m <sup>2</sup> /day	Day1.8.15	13日

<4週毎>

	Day1	Day8	Day15
アバスチン			
パクリタキセル			

**DAY1**

**DAY15**

レスタミンコーワ錠(10mg) 5錠内服 (内服後すぐ点滴スタート)

- ① (メイン) 生食 50ml にてルート確保 (点滴挿入確認後、フラッシュ分残す)
- ② (側管) グラセトンバッグ 100ml + オルガドロン (1.9mg) × 5A + ファモチジン (20mg) 1A (30分)  
\*パクリタキセル15分前~フローズングローブ・ソックス装着
- ③ (側管) 5%糖液250ml + パクリタキセル (60分) \*10分、30分、終了時観察  
(\*0.22ミクロン以下のインラインフィルター使用 DEHP (可塑剤) フリーのルート使用)
- ④ (側管) 生食50ml フラッシュ (15分)  
\*生食終了後フローズングローブ・ソックスはずす
- ⑤ (側管) 生食100ml + アバスチン ( ) 分 \*投与時間確認
- ⑥ ①の生食50ml 残液でフラッシュ (全開)  
\*アバスチン投与時間; 初回90分、2回目60分、3回目からは30分で投与

**DAY8**

レスタミンコーワ錠(10mg)5錠内服

- ① (メイン) 生食 50ml にてルート確保 (点滴挿入確認後、フラッシュ分残す)
- ② (側管) グラセトンバッグ 100ml + オルガドロン (1.9mg) × 5A + ファモチジン (20mg) 1A 30分  
\*パクリタキセル15分前~フローズングローブ・ソックス装着
- ③ (側管) 5%糖液250ml + パクリタキセル (60分) \*10分、30分、終了時観察  
(\*0.22ミクロン以下のインラインフィルター使用 DEHP (可塑剤) フリーのルート使用)
- ④ ①の生食50mlの残液でフラッシュ (15分)  
\*生食終了後フローズングローブ・ソックスはずす

備考

--