

<化学療法予約箋>

プロトコール名	(初回)パージェタ+トラスツズマブ+パクリタキセル療法
病名	乳癌

プロトコール

薬品名	成分名	基準値	施行日
パージェタ	ペルツズマブ	840 mg/day	Day1
トラスツズマブ	トラスツズマブ	8 mg/Kg/day	Day1
パクリタキセル	パクリタキセル	80 mg/m ² /day	Day1,8,15

<3週間ごと>

	Day1	Day8	Day15
施行日			

Day1

- ① (メイン) 生食 50ml にてルート確保 (点滴挿入確認後、フラッシュ分残す)
- ② (側管) 生食 250ml + パージェタ (60分)
- ③ (側管) 生食 250ml + トラスツズマブ (90分)
- ④ レスタミン5T (内服後すぐに点滴スタート)
- ⑤ (側管) グラセトンバッグ 100mL+オルガドロン(1.9mg) ×5A+ファモチジン(20mg) 1A 30分
*パクリタキセル15分~フローズングローブ・ソックス装着
- ⑥ (側管) 5%ブドウ糖液 250ml + パクリタキセル (1時間)
(*0.22ミクロン以下のインラインフィルター使用 DEHP(可塑剤)フリーのルート使用)
*10分後、30分後、投与終了観察
- ⑦ ①の生食50mlの残液でフラッシュ (15分)
*生食終了後フローズングローブ・ソックス使用はせず

Day8

Day15

- ① レスタミン5T内服(内服後すぐに点滴スタート)
- ② (メイン) 生食 50ml にてルート確保 (点滴挿入確認後、フラッシュ分残す)
- ③ (側管) グラセトンバッグ 100mL+オルガドロン(1.9mg) ×5A+ファモチジン(20mg) 1A 30分
*パクリタキセル15分~フローズングローブ・ソックス装着
- ④ (側管) ⑤%ブドウ糖液 250ml + パクリタキセル (1時間)
(*0.22ミクロン以下のインラインフィルター使用 DEHP(可塑剤)フリーのルート使用)
*10分後、30分後、投与終了観察
- ⑤②の生食50mlの残液でフラッシュ(15分)
*生食終了後、フローズングローブ・ソックス使用はせず

備考

--