

<化学療法予約箋>

プロトコール名	2回目以降 TCH-P
病名	乳がん

プロトコール

薬品名	成分名	基準値	施行日
パージェタ	ペルツツマブ	420mg/body	Day1
トラスツズマブ	トラスツズマブ	6 mg/kg	Day1
ドセタキセル	ドセタキセル	75 mg/m ² /day	Day1
カルボプラチン	カルボプラチン	AUC=6	Day1

<3週>

施行日	Day1

Day1

***末梢から投与の場合、ドセタキセル投与後に血管炎予防のため5%糖液250ml全開で投与**

- ① (メイン) 生食 50mL にてルート確保 (点滴挿入確認後、フラッシュ分残す)
- ② (側管) 生食 250ml + パージェタ (分) ***5分、10分、20分、30分、終了時観察**
 ※初回投与に忍容性あれば30分まで短縮可能
- ③ (側管) 生食 250mL + トラスツズマブ (分) ***5分、10分、20分、30分、60分、終了時観察**
 ※初回投与に忍容性あれば30分まで短縮可能
- ④ (側管) グラニセトロンバッグ100mL+オルガドロン1.9mg×4A+プロイメンド1V (60分)
***ドセタキセル15分前~フローズングローブ・ソックス装着**
- ⑤ (側管) 5%糖液250mL+ドセタキセル (60分)
***5分、10分、20分、30分、終了時観察**
- ⑥ (側管) 5%糖液 250mL + カルボプラチン (60分) ***5分、10分、20分、30分、終了時観察**
***カルボプラチン開始15分でフローズングローブ・ソックスはずす**
- ⑦ ①の生食50mLの残液でフラッシュ (全開)

備考