

# 乳腺外科412

# <化学療法予約箋>

プロトコール名	キイトルーダ + CBDCA + GEM
病名	

プロトコール

薬品名	成分名	基準値	施行日	休薬
キイトルーダ	ペムプロリズマブ	200 mg/body	DAY1	20日
ゲムシタビン	ゲムシタビン塩酸塩	1000 mg/m <sup>2</sup> /day	DAY 1.8	13日
カルボプラチン	カルボプラチン	AUC= 2	DAY 1.8	
3週毎				

施行日	DAY1	DAY8
キイトルーダ		
ゲムシタビン		
カルボプラチン		

## DAY 1

- ①(メイン) 生食50mLルート確保後フラッシュ分残す
- ②(側管) 生食 100mL +キイトルーダ 200mg (8mL) 点滴静注 (30分)  
**※インラインフィルター(0.2~5μm)を使用すること**
- ③(側管) グラニセトロン 3mg/100mL+オルガドロン1.9mg 4A (30分)
- ④(側管) 生食 100mL + ゲムシタビン mg (1000mg/m<sup>2</sup>) <30分で>  
**(必ず30分で滴下すること)**
- ⑤(側管) 5%ブドウ糖液250mL + カルボプラチン mg <60分で>
- ⑥(メイン) ①の生食50mLの残液でフラッシュ

## DAY8

- ①(メイン) 生食50mLルート確保後フラッシュ分残す
- ②(側管) グラニセトロン 3mg/100mL + オルガドロン1.9mg 4A (30分)
- ③(側管) 生食 100mL + ゲムシタビン mg (1000mg/m<sup>2</sup>) <30分で>  
**(必ず30分で滴下すること)**
- ④(側管) 5%ブドウ糖液250mL + カルボプラチン mg <60分で>
- ⑤(メイン) ①の生食50mLの残液でフラッシュ

備考