

<化学療法予約箋>

プロトコール名	乳がん キイトルーダ+PTX療法
病名	乳がん

プロトコール

薬品名	成分名	基準値	施行日	休薬
キイトルーダ	ペムプロリズマブ	200 mg/body	Day1.22.43.64	20日
パクリタキセル	パクリタキセル	90 mg/m ² /day	Day1.8.15.29.36.43.57.64.71	13日

<1週毎>

	day1	day8	day15	day22	day29	day36	day43	day50	day57	day64	day71	day78
キイトルーダ		/	/		/	/		/	/		/	/
パクリタキセル				/				/				/

Day1、43、64

- ①(メイン)生食 50mL にてルート確保(点滴挿入確認後、フラッシュ分残す)
- ②(側管)生食100mL +キイトルーダ200mg(8mL) 点滴静注 30分
※インラインフィルター(0.2~5μm)を使用すること
- ③レスタミンコーワ錠(10mg) 5錠内服
- ④(側管)グラニセロンバッグ3mg/100mL+オルガドロン(1.9mg) × 5A +ファモチジン(20mg) 1A 30分
***パクリタキセル15分前~フローズングローブ・ソックス装着**
- ⑤(側管)5%ブドウ糖 250ml + パクリタキセル 1時間
(0.22ミクロン以下のインラインフィルター使用 DEHP(可塑剤)フリーのルート使用)
投与10分、30分後、投与終了時観察
- ⑥ ①生食50mlの残液でフラッシュ(15分)
***生食終了後、フローズングローブ・ソックスはずす**

Day22

- ①(メイン)生食 50mL にてルート確保(点滴挿入確認後、フラッシュ分残す)
- ②(側管)生食100mL +キイトルーダ200mg(8mL) 点滴静注 30分
※インラインフィルター(0.2~5μm)を使用すること
- ③ ①生食50mlの残液でフラッシュ

Day8、15、29、36、57、71

- レスタミンコーワ錠(10mg) 5錠内服
- ①(メイン)生食 50mL にてルート確保(点滴挿入確認後、フラッシュ分残す)
 - ②(側管)グラニセロンバッグ3mg/100mL+オルガドロン(1.9mg) × 5A +ファモチジン(20mg) 1A 30分
***パクリタキセル15分前~フローズングローブ・ソックス装着**
 - ③(側管)5%ブドウ糖 250ml + パクリタキセル 1時間
(0.22ミクロン以下のインラインフィルター使用 DEHP(可塑剤)フリーのルート使用)
投与10分、30分後、投与終了時観察
 - ④ ①生食50mlの残液でフラッシュ(15分)
***生食終了後、フローズングローブ・ソックスはずす**

備考