

婦人科21

<化学療法予約箋>

プロトコール名	CDDP+RT併用療法
病名	

プロトコール

薬品名	成分名	基準値	施行日	休薬
シスプラチン	シスプラチン	40 mg/m ² /day	Day1.8.15.22.29.36	-

<6週毎>

	DAY1	DAY8	DAY15	DAY22	DAY29	DAY36
施行日						

施行日

- ①(メイン)生食 500mL+硫酸Mg 0.5A(1時間)
- ②(メイン)生食500mL(1時間) **プロイメンドによる血管炎の予防に同時に流す**
- ②(側管)グラニセトロンバッグ100mL + オルガドロン1.9mg 3A +プロイメンド1V(1時間)
- ③(側管)生食 500mL+ シスプラチン (1時間)
- ④(メイン)生食 500mL+ ラシックス 20mg 1A (1時間)
- ⑤(メイン)生食500mL+アスパラギン酸K(10meq) 1本 (1時間)

シスプラチン終了までに飲水1000mLを励行

施行日翌日、翌々日

経口飲水1000mL以上/日を実施(可能であれば経口補水液OS-1)

飲水の不足やそれが予測される場合は点滴負荷

<指示簿>

施行日:シスプラチン投与6時間後の尿量が500mL以下の場合、ラシックス20mg 静注

施行翌日:朝の体重が、1日目の点滴開始前より2.5kg以上増加、あるいは1日尿量1500mL以下でラシックス20mg

16時体重が朝より2.0kg以上増加、あるいは朝からの尿量が500mL以下でラシックス20mg静注