

婦人科33

<化学療法予約箋>

プロトコール名	禁アルGEM + DTX 併用療法
病名	

プロトコール

薬品名	成分名	基準値	施行日	休薬
タキソテール	ドセタキセル	70 mg/m <sup>2</sup> /day	DAY 8	13日
ジェムザール	ゲムシタピン塩酸塩	900 mg/m <sup>2</sup> /day	DAY 1.8	
3週毎				

施行日	DAY1	DAY8
タキソテール		
ジェムザール		

ジェムザール投与時血管痛対策のため温罨法

DAY 1

- ①(メイン)生食50mL (ルート確保後フラッシュ分残す)
- ②(側管)グラニセトロンバック+ オルガドロン(1.9mg) 4A (30分)
- ③生食 100ml + ジェムザール mg (30分)  
 <<ジェムザールは必ず30分で滴下させること>>
- ④①(メイン)生食50mLの残液全開

DAY 8 フロースングローブ・ソックス使用

- ①(メイン)生食50mL (ルート確保後フラッシュ分残す)
- ②(側管)グラニセトロンバック+ オルガドロン(1.9mg) 4A (30分)  
 \*タキソテール15分前~フロースングローブ・ソックス装着
- ③(側管)5%糖液 250mL + タキソテール mg (60分)  
 \*投与10分、30分、終了時観察
- ④(側管)生食100mL + ジェムザール mg <30分で>  
 <<ジェムザールは必ず30分で滴下させること>>  
 \*ジェムザール開始15分後フロースングローブ・ソックスはずす
- ⑤①(メイン)生食50mLの残液全開

DAY8はWBC3000,好中球1500、血小板10万以上を投与基準とする

備考