

婦人科38

<化学療法予約箋>

プロトコール名	dose-dense TC療法
病名	

プロトコール

薬品名	成分名	基準値	施行日	休薬
パクリタキセル	パクリタキセル	80 mg/m ² /day	Day 1.8.15	6日
カルボプラチン	カルボプラチン	AUC = 6	Day1	

3週毎

施行日	DAY1	DAY8	DAY15
パクリタキセル			
カルボプラチン			

フローズングローブ・ソックス使用

Day 1

DEHP（可塑剤）フリーのルート使用（0.22ミクロンのインラインフィルター付使用）

- ①レスタミンコーワ5錠 div開始前内服
- ②(メイン)生食50mL(ルート確保後、フラッシュ分残す)
- ③(側管)生食 100mL + アロキシ0.75mg + オルガドロン1.9mg 4A + ファモチジン20mg 1A <30分>
パクリタキセル開始15分前からフローズングローブ・ソックス装着
- ④(側管)生食250mL + パクリタキセル mg (60分)
 パクリタキセル 開始後バイタルチェック 0,5,10,30,60,120分
- ⑤(側管)5%ブドウ糖液 250mL + カルボプラチン mg <60分>
カルボプラチン開始15分後フローズングローブ・ソックスはずす
- ⑥②(メイン)生食50mLの残液全開

Day 8

Day 15

- ①レスタミンコーワ5錠 div開始前内服
- ②(メイン)生食50mL(ルート確保後、フラッシュ分残す)
- ③(側管)生食 100ml + オルガドロン 1.9mg 4A + ファモチジン20mg 1A (30分)
パクリタキセル開始15分前からフローズングローブ・ソックス装着
- ③(側管)生食250mL + パクリタキセル mg (60分)
 DEHP（可塑剤）フリーのルート使用(0.22ミクロンのインラインフィルター付使用)
 パクリタキセル 開始後バイタルチェック 0,5,10,30,60分
- ④②(メイン)生食50mLの残液を15分
カルボプラチン開始15分後フローズングローブ・ソックスはずす

製剤 アブラキサン：100mg/V カルボプラチン：50,450mg/V

備考

--