

消化器006

# <外化学療法予約箋>

プロトコール名	FOLFIRI療法
病名	

プロトコール

薬品名	成分名	基準値	施行日	休薬
イリノテカン	イリノテカン	150 mg/m <sup>2</sup> /day	Day 1	13日
5-FU	フルオロウラシル	400mg/m <sup>2</sup> (bolus)	Day 1	
		2400mg/m <sup>2</sup> (infusion)	Day 1(46hr)	
レボホリナート	レボホリナートカルシウム	200 mg/m <sup>2</sup> /day	Day 1	

2週毎に

	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目
施行日						
薬剤師						
看護師						

## 第1日目

- ①<メイン>グラニセトロンバッグ + オルガドロン(1.9mg) × 4A 30分
- ②<メイン> 5%ブドウ糖 250mL + レボホリナート mg 2時間かけて点滴
- ② <側管> 5%ブドウ糖 250mL + イリノテカン mg 90分かけて点滴
- ③レボホリナート終了後 <メイン> 5%ブドウ糖 50mL + 5-FU mg 全開
- ④5-FU全開後<メイン> 生食 500mL + 5-FU mg 22時間かけて持続点滴

## 第2日目

- ①<メイン> 生食 500mL + 5-FU mg 24時間かけて持続点滴
- ②<メイン> 生食50mLにてフラッシュ(①と同速度)

備考

--