

消化器203

<化学療法予約箋>

プロトコール名	ベクティビックス m-FOLFOX6療法
病名	

プロトコール

薬品名	成分名	基準値	施行日	休薬
ベクティビックス	パニツムマブ	6 mg/kg/day	Day 1	13日
エルプラット	オキサリプラチン	85 mg/m ² /day	Day 1	
5-FU	フルオウラシル	400mg/m ² (bolus)	Day 1	
		2400mg/m ² (infusion)	Day 1(46hr)	
レボホリナート	レボホリナートカルシウム	200 mg/m ² /day	Day 1	
2週毎に				

	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目
施行日						

①<メイン> グラニセトロンバッグ100ml + オルガドロン(1.9mg) × 4A (30分)

②<メイン> 生食 100mL + ベクティビックス (60分)

***ベクティビックスはインラインフィルター(0.2~0.22ミクロン)を用いて投与すること**

③<メイン> 5%ブドウ糖 250mL + エルプラット (2時間)

③ <側管> 5%ブドウ糖 250mL + レボホリナート (2時間)

***エルプラット7回目以降は、5分、10分、20分、30分、60分、90分、終了時観察**

④レボホリナート終了後<メイン> 5%ブドウ糖 50ml + 5-FU (全開)

⑤5-FU全開後<メイン> 生食+ 5-FU 46時間かけて持続点滴

注意 ベクティビックスは1000mg超えるときは、生食150ml必要となります(90分点滴)

備考

--