

消化器228

<外化学療法予約箋>

プロトコール名	2回目以降 アービタックス FOLFIRI療法
病名	

プロトコール

薬品名	成分名	基準値	施行日	休薬
アービタックス	セツキシマブ	250 mg/m ² /day	Day 1.8	6日
イリノテカン	イリノテカン	150 mg/m ² /day	Day 1	13日
5-FU	フルオウラシル	400mg/m ² (bolus)	Day 1	
		2400mg/m ² (infusion)	Day 1(46hr)	
レボホリナート	レボホリナートカルシウム	200 mg/m ² /day	Day 1	
2週毎に				

	1コース目	2コース目	3コース目	4コース目	5コース目	6コース目
施行日 DAY1						
施行日 DAY2						
施行日 DAY8						

第1日目

- ①<メイン>グラニセトロンバッグ + オルガドロン(1.9mg) × 4A+ポララミン1A (30分)
- ②<メイン>生食 250mL + アービタックス mg を点滴静注(60分)
アービタックス点滴終了後、同一ルートで③の生食 50mL を点滴
- ③<メイン>生食 50mL 投与 (30分)

30分経過観察

- ④<メイン>5%ブドウ糖 250mL + レボホリナート mg 2時間かけて点滴
- ④<側管> 5%ブドウ糖 250ml + イリノテカン mg 90分かけて点滴

レボホリナート終了後

- ⑤<メイン> 5%ブドウ糖 50mL + 5-FU mg 全開
- 5-FU全開後
- ⑥<メイン>KN3号 500mL + 5-FU mg 22時間かけて持続点滴

第2日目

- ①<メイン> KN3号 500mL + 5-FU mg 24時間かけて持続点滴
- ①抜針前に生食 50mLでフラッシュ(①と同速度)

第8日目

- ①生食50mLにてルート確保
- ②生食 100mL + オルガドロン(1.9mg) × 4A +ポララミン1A (30分)
- ③生食 250mL + アービタックス mg を点滴静注(60分)
- ④①の生食 50mL の残液でフラッシュ (30分)

30分 経過観察

備考