

消化器329

<化学療法予約箋>

| | |
|---------|-----------------------|
| プロトコール名 | 2回目以降 トラスツズマブ+SOX併用療法 |
| 病名 | 胃がん |

プロトコール

| 薬品名 | 成分名 | 基準値 | 施行日 | 休薬 |
|---------|-------------------------|----------------------------|---------|-----|
| トラスツズマブ | トラスツズマブ | 6 mg/Kg/day | Day1 | 20日 |
| エルプラット | オキサリプラチン | 100 mg/m ² /day | Day1 | |
| S-1 | テガフル・キメラシル・オテラシ ルK合剤 | 80~120mg/分2 | 2週間連続投与 | 7日 |
| <3週間毎> | | | | |

| 施行日 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 6回目 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| トラスツズマブ | | | | | | |
| エルプラット | | | | | | |

Day1

- ①(メイン) 生食 50mLにてルート確保(点滴挿入確認後、点滴終了後のフラッシュ分残す)
- ②(側管) グラニセトロンバッグ 100mL + オルガドロン 1.9mg×3A 30分
- ③(側管) 生食250mL + トラスツズマブ () * 投与時間確認
- ④(側管) 5%ブドウ糖液 500mL + エルプラット(120分) * 血管痛対策にホットパック
* 7回目以降は5分、10分、20分、30分、60分、90分、終了時観察
- ⑤(メイン) ①の生食50mLの残液でフラッシュ(全開)

*トラスツズマブ投与時間;2回目以降は30分まで短縮可

備考

| |
|--|
| |
|--|