

プロトコール名	テセントリク+CBDCA + nabPTX
病名	扁平上皮除く非小細胞癌

## プロトコール

薬品名	成分名	基準値	施行日
テセントリク	アテゾリズマブ	1200 mg/body	DAY 1
カルボプラチン	カルボプラチン	AUC= 6	DAY 1
アブラキサン	パクリタキセル	100 mg/m <sup>2</sup>	DAY1.8.15

&lt;3週 1クール&gt;

施行日	DAY1	DAY8	DAY15
テセントリク			
カルボプラチン			
アブラキサン			

フローズングローブ使用

アブラキサン血液製剤  
ロット入力必要

## DAY 1

- ①(メイン)生食50mL(ルート確保後フラッシュ分残す)
- ②(側管)生食250mL+ テセントリク1200mg(20mL) ( 分 ) \*下記表にて投与時間確認  
\*初回60分投与。2回目以降忍容性あれば、30分で投与。  
\*0.2μmまたは0.22μmのフィルターつきDEHPフリールート
- ③(メイン)生食250ml (60分) \*プロイメンドによる血管炎予防のため同時に流す
- ③(側管)グラニセトロンバック3mg/100mL +プロイメンド1V+オルガドロン1.9mg 4A <60分>  
\*アブラキサン15分前～フローズングローブ・ソックス装着
- ④(側管)生食(1Vあたり20mL)+アブラキサン <30分> \*5分、10分、終了時観察  
\*アブラキサン投与はインラインフィルター不可
- ⑤(側管)生食50mL(15分) \*生食終了後にフローズングローブ・ソックスはずす
- ⑥(側管)5%ブドウ糖液 250mL + カルボプラチン mg(AUC=6) <60分>
- ⑦(メイン)①の生食50mLの残液にてフラッシュ(全開)

## DAY 8

## DAY 15

- ①(メイン)生食50mL(ルート確保後フラッシュ分残す)
- ②(側管)生食 100mL + オルガドロン (1.9mg) 4A <30分で>  
\*アブラキサン15分前～フローズングローブ・ソックス装着
- ③(側管)生食(1Vあたり20mL)+アブラキサン mg <30分>  
\*アブラキサン投与はインラインフィルター不可
- ④(メイン)①の生食50mLの残液にてフラッシュ(15分)  
\*生食終了後、フローズングローブ・ソックスはずす

## 備考

--