

呼吸器内科-130 <化学療法予約箋>

プロトコール名	Ipi+Nivo+CBDCA+PTX
病名	非小細胞癌sq

プロトコール

薬品名	成分名	基準値	施行日
オプジーボ	ニボルマブ	360 mg/body	day1,22
ヤーボイ	イピリムマブ	1 mg/kg	day1
パクリタキセル	パクリタキセル	200 mg/m ² /day	day1,22
カルボプラチン	カルボプラチン	AUC= 6	

6週毎

施行日	day1	day22
-----	------	-------

フローズングローブ・ソックス使用

DAY -2 化学療法 3日前

内服: 芍薬甘草湯 3包/分3 × 10日間を内服開始

day1

※全てDEHPフリールートでインラインフィルター(0.2又は0.22 μ m)を使用すること

- ①(メイン)生食 250mL にてルート確保(点滴挿入確認後、点滴終了後のフラッシュ分残す)
- ②(側管)生食100mg+オプジーボ360mg (36mL)点滴 (30分)
- ③(側管)生食50mLにて30分経過観察
- ④(側管)生食50mL+ ヤーボイ mg (30分)
- ⑤ ①生食をプロイメンドと同時に150L/hで流す(その後残液残す)
- ⑤(側管) グラニセトロンバッグ3mg/100mL + オルガドロン (19mg) 1V +プロイメンド1V+ ファモチジン(20mg) 1A+ボラミン1A <60分で>
パクリタキセル開始15分前からフローズングローブ・ソックス開始
- ⑦(側管) 生食 500ml + パクリタキセル mg(200mg/m²) <180分で>
 パクリタキセル 開始後バイタルチェック 0,5,10,30,60,120,180分
- ⑧(側管) 5% TZ 250ml + カルボプラチン(AUC=6) <60分で> **パクリタキセル終了15分後フローズングローブ・ソックス終了**
- ⑨①生食残液でフラッシュ(全開)

day22

※全てDEHPフリールートでインラインフィルター(0.2又は0.22 μ m)を使用すること

- ①(メイン)生食 250mL にてルート確保(点滴挿入確認後、点滴終了後のフラッシュ分残す)
- ②(側管)生食100mg+オプジーボ360mg (36mL)点滴 (30分)
- ③①生食をプロイメンドと同時に150mL/hで流す(残液残す)
- ④(側管)グラニセトロンバッグ3mg/100mL + オルガドロン (19mg) 1V +プロイメンド1V+ ファモチジン(20mg) 1A <60分で>
- ⑤⑥パクリタキセル投与30分前に**レスタミン内服**
パクリタキセル開始15分前からフローズングローブ・ソックス開始
- ⑥(側管)生食 500ml + パクリタキセル mg(200mg/m²) <180分で>
 パクリタキセル 開始後バイタルチェック 0,5,10,30,60,120,180分
- ⑦(側管) 5% TZ 250ml + カルボプラチン(AUC=6) <60分で> **パクリタキセル終了15分後フローズングローブ・ソックス終了**
- ⑧①生食残液でフラッシュ(全開)

備考

1クールのみ その後106へ