

呼吸器内科132 <化学療法予約箋>

プロトコール名	Ipi+Nivo+CBDCA + PEM 療法
病名	非小細胞癌非sq

プロトコール

薬品名	成分名	基準値	施行日
オブジーボ	ニボルマブ	360 mg/body	day 1,22
ヤーボイ	イピリムマブ	1 mg/kg	day1
カルボプラチン	カルボプラチン	AUC= 5	day1,22
アリムタ	ペメトレキセドナトリウム水和物	500 mg/m ² /day	day1,22

<6週>

施行日	DAY1	DAY22

1週間前(DAY -7) パンビタン末 1g/日 内服開始

(最終投与1ヶ月後まで投与を継続すること)

1週間前 フレスミン1Aまたはメチコバル500μg 2A筋注 (9週ごと)

DAY 1

※オブジーボ、ヤーボイはインラインフィルター(0.2又は0.22μm)を使用すること

- ①(メイン)生食 250mL にてルート確保(点滴挿入確認後、点滴終了後のフラッシュ分残す)
- ②(側管)生食100mg+オブジーボ360mg (36mL)点滴 (30分)
- ③(側管)生食50mLにて30分経過観察
- ④(側管)生食 50mL + ヤーボイ mg (30分)
- ⑤①生食をプロイメンドと同時に150mL/hで流す(残液残す)
- ⑤(側管)グラニセトロンバック3mg/100mL+プロイメンド1V+オルカトロン1.9mg 4A <60分で>
- ⑥(側管)生食 100mL + アリムタ mg (500mg/m²) <10分で>
(必ず10分で滴下すること)
- ⑦(側管)5%ブドウ糖液 250mL + カルボプラチン mg (AUC=5) <60分で>
- ⑧(メイン)①生食の残液でフラッシュ(全開)

day22

※オブジーボ、ヤーボイはインラインフィルター(0.2又は0.22μm)を使用すること

- ①(メイン)生食 250mL にてルート確保(点滴挿入確認後、点滴終了後のフラッシュ分残す)
- ②(側管)生食100mg+オブジーボ360mg (36mL)点滴 (30分)
- ③①生食をプロイメンドと同時に150mL/hで流す(残液残す)
- ③(側管)グラニセトロンバック3mg/100mL+プロイメンド1V+オルカトロン1.9mg 4A <60分で>
- ④(側管)生食 100mL + アリムタ mg (500mg/m²) <10分で>
(必ず10分で滴下すること)
- ⑤(側管)5%ブドウ糖液 250mL + カルボプラチン mg (AUC=5) <60分で>
- ⑥(メイン)①生食の残液でフラッシュ(全開)

備考

--