

呼吸器内科201 <化学療法予約箋>

プロトコール名	CDDP+PEM 併用療法
病名	

プロトコール

薬品名	成分名	基準値	施行日	休薬
シスプラチン	シスプラチン	75 mg/m ² /day	DAY 1	20日
アリムタ	ペムレキセドナトリウム水和物	500 mg/m ² /day		

3週毎

施行日	DAY1
シスプラチン	
アリムタ	

1週間前(DAY -7) パンビタン末 1g/日 内服開始

(最終投与1ヶ月後まで投与を継続すること)

1週間前 フレスミン1Aまたはメチコバル500μg 2A筋注 (9週ごと)

DAY 1

- ① (メイン) 生食50mL (ルート確保後、フラッシュ分残す)
- ② (側管) KN1号 500mL + アスパラギン酸カリウム10mL(K 10mEq) + 硫酸Mg 10mL(Mg10mEq) <60分
- ③ (側管) 生食 250mL + プロイメンド1V+パロノセトロン(0.75mg) 1V + オルガドロン(1.9mg) 4A <60分
- ④ (側管) 生食 100mL + アリムタ mg (500mg/m²) <10分で
(必ず10分で滴下すること!)
- ⑤ (側管) マンニトール 300mL <45分で
- ⑥ (側管) 生食 500mL + シスプラチン mg <60分で
- ⑦ (側管) KN1号 500mL + アスパラギン酸カリウム10mL(K 10mEq) <60分で
- ⑧① 生食の残液でフラッシュ(⑦と同速度)

* アリムタ投与前後5日間はNSAIDsの服用回避が望ましい

DAY 1~3

経口にて1日1000mL以上の飲水を行う。(可能であれば経口補水液 OS-1)

DAY 2~3

Day2よりデカドロン(0.5mg) 16錠/朝食後 を2日間内服。

備考

--