

呼吸器内科509 <化学療法予約箋>

プロトコール名	MVP療法
病名	非小細胞癌

プロトコール

薬品名	成分名	基準値	施行日	休薬
フィルデシ	ヒンデシ	3 mg/m ² /day	DAY 1.8.15	20日
シスプラチ	シスプラチ	80 mg/m ² /day	DAY 1	
マイトマイシ	マイトマイシC	8 mg/m ² /day		
5週毎				

施行日	Day 1	Day 8	Day 15
フィルデシ			
シスプラチ			
マイトマイシ			

Day 0 化学療法前日 #VALUE!

IVH (シングルルーメン,30cm)を鎖骨下または内頸静脈から挿入、その後
 本体: (KN3号 500mL + プリンペラン 1A) × 2本/Day

Day 1

本体: (KN3号 500mL + プリンペラン 1A) × 3本/Day
 (ポタコール R 500mL) × 3本/Day

- 側管: ①(点滴) 生食 100mL + オルガドロ (19mg) 1V <30分で>
 ②(点滴) グラニセロンバック3mg/100mL <30分で>
 ③(点滴) 5%ブドウ糖液 500mL + シスプラチン mg (80mg/m²) <120分で>
 ④(点滴) 生食 100mL + フィルデシ mg (3mg/m²) <30分で>
 (最大投与量: 4.5mg/bodyまで)
 ⑤(点滴) 20% マンニトール 300mL <30分で>
 ⑥(点滴) 生食 100mL + マイトマイシ mg (8mg/m²) <30分で>

*9:00~18:00までで尿量2500mL以下の時はラシックス (20mg) 1A 静注

Day 2 #VALUE!

*前日18:00~9:00までで尿量1000mL以下の時はラシックス (20mg) 1A 静注
 本体: (KN3号 500mL + プリンペラン 1A) × 2本/Day
 (ポタコール R 500mL) × 2本/Day

側管: (点滴) グラニセロンバック3mg/100mL <30分で>

Day 3 #VALUE!

本体: KN3号 500mL + プリンペラン 1A
 (ポタコール R 500mL) × 2本/Day

側管: (点滴) グラニセロンバック3mg/100ml <30分で>

以後、状態を見て主治医の判断で適宜、IVHを抜去

Day1で吐き気が強いとき、グラニセロンバック3mg/100ml を1回のみ夕方、主治医の判断で追加可

Day4以降で嘔気、嘔吐、食欲不振があれば、IVHを継続しても良い。

Day 8

Day 15

朝 9:00 より KN3号 200ml でルートキープ

(点滴) 生食 100ml + フィルデシ mg (3mg/m²) <30分で>

*ただしDay 15はWBC 3000以下なら中止。(最大投与量: 4.5mg/bodyまで)

* 製剤シスプラチン 10,25,50mg/V,フィルデシ 1,3mg/V,マイトマイシ 2,10mg/V

--