

血液内科 15

プロトコール名

CHOP療法

プロトコール

薬品名	成分名	基準値	施行日	休薬
プレドニン	プレドニゾロン	100 mg/body	Day 1-5	9日
ドキシルビシン塩酸塩	塩酸ドキシルビシン	50 mg/m ² /day	Day 1	13日
オンコビン	塩酸ビンクリスチン	1.4 mg/m ² /day		
エンドキサン	シクロホスファミド	750 mg/m ² /day		

< 2週 1クール >

施行日	Day 1
ドキシルビシン塩酸塩	
オンコビン	
エンドキサン	

Day 1-5

~

プレドニン(5mg) 20錠(朝 10錠 ・ 昼 10錠)を5日間内服

Day 1

- ①(メイン) 生食 250mL にてルート確保(点滴挿入後、フラッシュ分残す)
- ②(側管) グラニセトロンバック 100mL 30分かけて点滴静注
- ③(側管) 生食 100mL + ドキシルビシン塩酸塩 30分かけて点滴静注
- ④(側管) 生食 50mL + オンコビン 15分かけて点滴静注
- ⑤(側管) 生食 500mL + エンドキサン 2時間かけて点滴静注
- ⑥ ①の生食250ml残液でフラッシュ(全開)

備考

--