

血液内科 18

プロトコール名 VDS使用(同日投与)R CHOP療法

プロトコール

薬品名	成分名	基準値	施行日	休薬
リツキサン	リツキシマブ	375 mg/m ² /day	Day1	13日
プレドニン	プレドニゾン	100 mg/body	Day 1-5	9日
ドキシルビシン塩酸塩	塩酸ドキシルビシン	50 mg/m ² /day	Day 1	13日
フィルデシン	ビンデシン硫酸塩	2.1 mg/m ² /day		
エンドキサン	シクロホスファミド	750 mg/m ² /day		

<2週 1クール>

施行日	Day 1
リツキサン	
ドキシルビシン塩酸塩	
フィルデシン	
エンドキサン	

Day 1-5

~

プレドニン(5mg) 20錠(朝 10錠 ・ 昼 10錠)を5日間内服

Day 1

アセトアミノフェン(200mg)2錠 レボセチリジン5mg 1錠 内服(30待機)

① (メイン) 生食 500 mL + リツキサン mg 点滴静注

リツキサンの点滴速度

I 開始後1時間 (ml/時間)

II 開始後1時間から2時間(1時間) (ml/時間)

III 開始後2時間以降 (ml/時間)

② (メイン) 生食 500mLにてルートキープ

③ (側管) グラニセトロンバック 100mL 30分かけて点滴静注

④ (側管) 生食 100mL + ドキシルビシン塩酸塩 mg 30分かけて点滴静注

⑤ (側管) 生食 50mL + フィルデシン mg 15分かけて点滴静注

⑥ (側管) 生食 500mL + エンドキサン mg 2時間かけて点滴静注

備考

--