

血液内科 34

プロトコール名	VDS R-EPOCH 療法
---------	----------------

プロトコール

薬品名	成分名	基準値	施行日	休薬
リツキサン	リツキシマブ	375 mg/m ² /day	Day1	20日
プレドニン	プレドニゾン	60 mg/m ² /day	Day 1-5	16日
エトポシド	エトポシド	50 mg/m ² /day	Day 1-4	17日
フィルデシン	ビンデシン硫酸塩	0.6 mg/m ² /day		
ドキシソルピシン	ドキシソルピシン塩酸塩	10 mg/m ² /day		
エンドキサン	シクロホスファミド	750 mg/m ² /day	Day5	16日

< 3週 1クール >

施行日	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5
リツキサン					
エトポシド					
フィルデシン					
ドキシソルピシン					
エンドキサン					

Day 1- 5

プレドニン 60mg/m²/日 を5日間内服

Day 1

アセトアミノフェン(200mg)2錠 レボセチリジン5mg 1錠 内服(30待機)

- ①(メイン) 生食 500 mL + リツキサン mg 点滴静注
- ②(メイン) 5%ブドウ糖液 500mL + フィルデシン mg + ドキシソルピシン塩酸塩 mg+ エトポシド mg 24時間持続点滴

リツキサンの点滴速度
I 開始後1時間 (ml/時間)
II 開始後1時間から2時間(1時間) (ml/時間)
II 開始後1時間から2時間(1時間) (ml/時間)

Day 2- 4

- ①(メイン) 5%ブドウ糖液 500mL + フィルデシン mg + ドキシソルピシン塩酸塩 mg+ エトポシド mg 24時間持続点滴

遮光袋かけてください(フィルデシンは蒸留水で1次溶解 1mgあたり1mL)

Day 5

- ①(メイン)グラニセトロンバック 30分
- ②(メイン) 生食 500mL + エンドキサン mg 2時間かけて点滴静注

備考

--