

血液内科-38

プロトコール名	(皮下)(Twice-weekly)m-CyBorD療法
病名	多発性骨髄腫

プロトコール

薬品名	成分名	基準値		施行日	休薬
ベルケイド	ボルテゾミブ	1.3	mg/m ² /day	Day1.4.8.11	17日
エンドキサン	シクロフォスファミド	300	mg/m ² /day	Day1.8.15.22	6日
レナデックス	デキサメタゾン	40	mg/day	Day1-4.9-12.17-20	8日

4週ごと

施行日	Day1	Day4	Day8	Day11	day15	day22
ベルケイド						
エンドキサン						

<Day1.8>

Day1

Day8

- ① 生食1.2ml + ベルケイド mg 皮下注射
(生食1.2mlで溶解し2.5mg/mlの調整液とする)
- ②(メイン) 生食500ml ルートキープ
- ③(側管) グラニセトロンバック100ml 点滴静注 (30分)
- ④(側管) 生食500ml + エンドキサン mg 点滴静注 (2時間)

<Day4.11>

Day4

Day11

- ① 生食1.2ml + ベルケイド mg 皮下注射
(生食1.2mlで溶解し2.5mg/mlの調整液とする)

<Day15.22>

Day15

Day22

- ①(メイン) 生食500ml ルートキープ
- ②(側管) グラニセトロンバック100ml 点滴静注 (30分)
- ③(側管) 生食500ml + エンドキサン mg 点滴静注 (2時間)

備考