

# 血液内科41

|         |        |
|---------|--------|
| プロトコール名 | DeVIC  |
| 病名      | 悪性リンパ腫 |

## プロトコール

| 薬品名     | 成分名      | 基準値                         | 施行日       | 休薬  |
|---------|----------|-----------------------------|-----------|-----|
| カルボプラチン | カルボプラチン  | 300 mg/m <sup>2</sup> /day  | DAY 1     | 20日 |
| エトポシド   | エトポシド    | 100 mg/m <sup>2</sup> /day  | DAY 1.2.3 | 18日 |
| イホマイド   | イフォスファミド | 1500 mg/m <sup>2</sup> /day | DAY 1.2.3 |     |
| オルガドロン  | デキサメタゾン  | 40 mg/body/day              | DAY1.2.3  |     |

<3週 1クール>

| 施行日 | DAY1 | DAY2 | DAY3 |
|-----|------|------|------|
|     |      |      |      |

2コース以上最大6コースまで

### Day1

(メイン)①生食500mL × 本 翌朝までキープ  
 (側管)②グラニセトロン+オルガドロン19mg × 2 (30分)  
 (側管)③ウロミテキサン mg (イホマイド開始時)  
 (側管)③生食500mL+イホマイド mg (120分)  
 (側管)④生食50mL (③と同速度)  
 (側管)⑤5%糖液250mL+カルボプラチン mg (60分)  
 (側管)⑥5%糖液500mL+エトポシド mg (120分)  
 (側管)⑦ウロミテキサン mg (③の4時間後)  
 (側管)⑧ウロミテキサン mg (⑦の4時間後)

### Day2 Day3

(メイン)①生食500mL × 本 翌朝までキープ  
 (側管)②グラニセトロン+オルガドロン19mg × 2 (30分)  
 (側管)③ウロミテキサン mg (イホマイド開始時)  
 (側管)③生食500mL+イホマイド mg (120分)  
 (側管)④生食50mL (③と同速度)  
 (側管)⑤5%糖液500mL+エトポシド mg (120分)  
 (側管)⑥ウロミテキサン mg (③の4時間後)  
 (側管)⑦ウロミテキサン mg (⑦の4時間後)

### 備考

|  |
|--|
|  |
|--|