

血液内科 49

プロトコル名	ポテリジオ+mLSG15 療法
病名	ATLL

プロトコル

薬品名	成分名	基準値	施行日	休薬
プレドニン	プレドニゾン	40 mg/m ² /day	Day 2、9、16-18	11日
ポテリジオ	モガムリズマブ	1 mg/kg/day	Day1、15	14日
オンコピン	ピンクリスチン硫酸塩	1 mg/m ² /day	Day 2	27日
エンドキサン	シクロホスファミド	350 mg/m ² /day		
ドキシソルピシン(Day2)	ドキシソルピシン塩酸塩	40 mg/m ² /day	Day9	20日
ドキシソルピシン(Day9)	ドキシソルピシン塩酸塩	30 mg/m ² /day		
サイメリン	ラニムスチン	60 mg/m ² /day		
フィルデシン	ビンデシン硫酸塩	2.4 mg/m ² /day	Day16	13日
エトポシド	エトポシド	100 mg/m ² /day	Day16-18	11日
カルボプラチン	カルボプラチン	250 mg/m ² /day	Day16	13日

< 29日 1クール >

施行日	Day 1	Day2	Day9	Day15	Day 16	Day17	Day18
プレドニン							
ポテリジオ							
オンコピン							
エンドキサン							
ドキシソルピシン(Day2)							
ドキシソルピシン(Day9)							
サイメリン							
フィルデシン							
エトポシド							
カルボプラチン							

ポテリジオは投与8回まで
mLSG15療法は6クールまで

Day1

Day15

- ① (メイン)生食500mL(ルートキープ)
アセトアミノフェン(200mg)2錠 レボセチリジン5mg 1錠 内服(ポテリジオ開始30分前)
② (側管)生食100mL+ソル・コーテフ100mg 30分
③(側管) 生食 250mL + ポテリジオ mg 点滴静注2時間

Day2

Day9

Day16~18

- プレドニン mg 内服
① (メイン)生食500mL(ルートキープ)
② (側管)グラニセトロンパック3mg/100mL 30分

Day2

- ③(側管) 生食 50mL + オンコピン mg 点滴静注15分 遮光袋かける (Max 2mgまで)
④(側管) 生食 50mL + ドキシソルピシン mg 点滴静注15分
⑤(側管) 生食250mL + エンドキサン mg 点滴静注2時間
⑥①の生食の残液でフラッシュする (⑤と同速度)

Day9

- ③(側管) 生食 50mL + ドキシソルピシン mg 点滴静注15分
④(側管) 5%ブドウ糖 250mL + サイメリン mg 点滴静注1時間
⑤①の生食の残液でフラッシュする (④と同速度)

Day16

- ③(側管) 生食 50mL + フィルデシン mg 点滴静注15分 遮光袋かける
④(側管) 5%ブドウ糖 250mL + エトポシド mg 点滴静注2時間
⑤(側管) 5%ブドウ糖 250mL + カルボプラチン mg 点滴静注2時間
⑥①の生食の残液でフラッシュする (⑤と同速度)

Day17

Day18

- ③(側管) 5%ブドウ糖 250mL + エトポシド mg 点滴静注2時間
④①の生食の残液でフラッシュする (③と同速度)

備考

--