血液内科　62

プロトコール名	(2クール目)DLd療法

プロトコール

薬品名	成分名	基準値	施行日	休薬
ダラザレックス	ダラツムマブ	16　mg/Kg/day	Day 1、8、15、22	6日
レブラミド	レナリドミド	25　mg/day	Day 1-21	7日
レナデックス・オルガドロン	デキサメタゾン	40　mg/week	Day1、2、8、9、15、16、22、23	5日

＜4週　1クール＞

施行日	Day 1	Day 8	Day 15	Day 22
ダラザレックス				

Day1　　Day8　　Day15　　Day22

①アセトアミノフェン200mg　2錠 ＋ レボセチリジン5mg 1錠（ダラザレックス投与1時間前内服）＊*内服後すぐに点滴スタート*

①生食250mlにてルート確保（点滴挿入後、フラッシュ分残す）

②（側管）生食100mL＋オルガドロン19mg　1V（ダラザレックス投与1時間前に開始）（30分）

③（側管）生食50ml （30分）

④（側管）生食 500mL + ダラザレックス　＊*下記表にて投与時間確認*

＊*インラインフィルター(0.2μm)を通して投与すること*

⑤ ①の生食250ml残液でルートを流す（全開）

Day2、9、16、23

レナデックス4mg　錠　内服

ダラザレックスの投与速度

希釈後の総量	投与開始からの投与速度（mL/時）			
	0～1時間	1～2時間	2～3時間	3時間以降
500mL				

備考