

# 血液内科 69

プロトコール名	オビヌツズマブ+ベンダムスチン療法1コース目
---------	------------------------

プロトコール

薬品名	成分名	基準値	施行日	休薬
ガザイバ	オビヌツズマブ	1000 mg/body/day	Day1.8.15	13日
トレアキシシ	ベンダムスチン	120 mg/m <sup>2</sup> /day	Day1.2	26日

4週毎

施行日	Day 1	Day 2	Day8	Day15
ガザイバ				
トレアキシシ				

## Day 1

- ①(メイン) 生食 250mL にてルート確保 (⑦で経過観察30分ぶん残す)
- ②(側管) グラニセトロンバック3mg 100mL + オルガドロン 19mg/5mL (30分)
- ③アセトアミノフェン500mg 2錠、レボセチリジン5mg 1錠内服(ガザイバ投与1時間前)
- ④(側管) 生食 250 mL + トレアキシシ 点滴静注 (1時間)
- ⑤(側管) 生食 50mL ルートフラッシュ(全開)
- ⑥(側管) 生食 210 mL + ガザイバ1000mg 点滴静注

**\* 0.2又は0.22 μmのインラインフィルターを使用**

- ⑦(メイン) ①生食 250mL にてフラッシュ(30分) 経過観察

**ガザイバの点滴速度(初回投与時: Day1)**

**\* 医師の指示確認**

I 開始後から30分後まで ( mL/時間)

II 開始後30分後から開始後60分まで(30分) ( mL/時間)

III 開始後60分後から開始後90分後まで ( mL/時間)

IV 開始後90分後以降 ( mL/時間)

## Day 2

- ①(メイン) 生食 50mL にてルート確保
- ②(側管) グラニセトロンバック3mg 100mL + オルガドロン1.9mg × 2A (30分)
- ③(側管) 生食 250 mL + トレアキシシ mg 点滴静注 (1時間)
- ④(メイン) ①生食 50mL にてフラッシュ(③と同速度)

## Day 8

## Day 15

- ① デキサメタゾン 20mg、アセトアミノフェン500mg 2錠、レボセチリジン5mg 1錠内服(ガザイバ投与1時間前)
- ②(メイン) 生食 250mL にてルート確保 (④で経過観察30分ぶん残す)
- ③(側管) 生食 210 mL + ガザイバ 1000 mg 点滴静注

**0.2又は0.22 μmのインラインフィルターを使用**

- ④(メイン) ①生食 250mL にてフラッシュ(③と同速度、30分経過観察)

**ガザイバの点滴速度(Day8、Day15)**

**\* 医師の指示確認**

I 開始後から30分後まで ( mL/時間)

II 開始後30分後以降 ( mL/時間)

※トレアキシシ100mg 1Vあたり蒸留水40ml必要です。

※トレアキシシ溶解後3時間以内に点滴終了してください(3時間以上で力価低下)

備考

--