

血液内科 74

プロトコール名	(維持投与)オビヌツズマブ療法
---------	-----------------

プロトコール

薬品名	成分名	基準値	施行日
ガザイバ	オビヌツズマブ	1000 mg/body/day	Day1

2ヶ月ごと

施行日	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目
ガザイバ						

Day 1

- ①アセトアミノフェン500mg 2T+レボセチリジン5mg 1T(ガザイバ投与1時間前)
*** 内服後すぐに点滴スタート**
- ②生食250mlにてルート確保(点滴挿入後、フラッシュ分残す)
- ③(側管)生食100mL+オルガドロン19mg 1V(30分)
- ④(側管)生食50ml(30分)
- ③(側管)生食 210 mL + ガザイバ 1000 mg (40mL) 点滴静注
*** 0.2又は0.22 μ mのインラインフィルターを使用**
- ④(メイン) ①生食 250mL にてフラッシュ(30分) 経過観察する

ガザイバの点滴速度(Day1)

- I 開始後から30分後まで (25 mL/時間)
- II 開始後30分後から開始後60分まで(30分) (50 mL/時間)
- III 開始後60分後から開始後90分後まで (75 mL/時間)
- IV 開始後90分後以降 (100 mL/時間)

*** 開始後、50ml/時間からOKのこともあり医師に確認して下さい**

備考

--