

血液内科 79

プロトコール名 (2クール目)DKd療法

プロトコール

薬品名	成分名	基準値		施行日
ダラザレックス	ダラツムマブ	16	mg/Kg/day	Day 1、8、15、22
カイプロリス	カルフィルゾミブ	56	mg/m ² /day	Day 1、2、8、9、15、16
レナデックス・オルガドロン	デキサメタゾン	40	mg/week	Day1、2、8、9、15、16、22

< 4週 1クール >

施行日	Day 1	Day 2	Day 8	Day 9

施行日	Day15	Day16	Day22

Day1 Day8 Day15

アセトアミノフェン200mg 2錠 + レボセチリジン5mg 1錠 (ダラザレックス投与1時間前内服) ***内服後すぐに点滴スタート**

- ① (メイン) 生食50mL (ルート確保後、フラッシュ分残す)
- ② (側管) 生食100mL + オルカドロン19mg 1V(ダラザレックス投与1時間前に開始して30分で投与)
- ③ (側管) 5%ブドウ糖液100mL + カイプロリス 30分点滴 ***ミキシング時、エアー入れてもらうこと!**
- ④ (側管) 生食 500mL + ダラザレックス mg 点滴静注
***インラインフィルター(0.2μm)を通して投与すること**
- ⑤ ①の生食でルートを流す(全開)

Day2 Day9 Day16

レナデックス4mg 錠 カイプロリス投与30分前内服

- ① (メイン) 生食50mL (ルート確保後、フラッシュ分残す)
- ② (側管) 5%ブドウ糖液100mL + カイプロリス 30分点滴 ***ミキシング時、エアー入れてもらうこと!**
- ③ ①の生食でルートを流す(全開)

Day22

アセトアミノフェン200mg 2錠 + レボセチリジン5mg 1錠 (ダラザレックス投与1時間前内服) ***内服後、すぐに点滴スタート**

- ① (メイン) 生食50mL (ルート確保後、フラッシュ分残す)
- ② (側管) 生食100mL + オルカドロン19mg 1V(ダラザレックス投与1時間前に開始して30分で投与)
- ③ (側管) 生食50mL 30分点滴
- ④ (側管) 生食 500mL + ダラザレックス 点滴静注
***インラインフィルター(0.2μm)を通して投与すること**
- ⑤ ①の生食でルート流す(全開)

ダラザレックスの投与速度

投与時期	希釈後の総量	投与開始からの投与速度 (mL/時)		
		0~1時間	1~2時間	2時間以降
Day1以降	500mL	100	150	200

備考

--