

血液82

プロトコール名	増量BEACOPP
病名	ホジキンリンパ腫

プロトコール

薬品名	成分名	基準値	施行日
(B)ブレオ	ブレオマイシン	10 mg/m ² /day	Day8
(E)エトポシド	エトポシド	200 mg/m ² /day	Day1-3
(A)ドキシソルビシン	ドキシソルビシン	35 mg/m ² /day	Day1
(C)エンドキサン	シクロホスファミド	1250 mg/m ² /day	Day1
(O)オンコピン	ピンクリスチン	1.4 mg/m ² /day	Day8
(P)プレドニン	プレドニゾン	40 mg/m ² /day	Day1-14
(P)プロカルバジン	プロカルバジン	100 mg/m ² /day	Day1-7

3週間ごと

Day 1-7

プロカルバジン内服

Day 1-14

プレドニン内服

Day 1

- ① (メイン) 生食 500mL にてルートキープ
- ② (側管) 生食 100mL + パロノセトロン1V 30分かけて点滴静注
- ③ (側管) 生食 1000mL + エトポシド 4時間かけて点滴静注
- ④ (側管) 生食 100mL + ドキシソルビシン塩酸塩 30分かけて点滴静注
- ⑤ (側管) 生食 500mL + エンドキサン 2時間かけて点滴静注
- ⑥ (メイン) ①生食 500mL の残液にてルートフラッシュ

Day 2,3

- ① (メイン) 生食 500mL にてルートキープ
- ② (側管) 生食 1000mL + エトポシド 4時間かけて点滴静注
- ③ (メイン) ①生食 500mL の残液にてルートフラッシュ

Day 8

- ① (メイン) 生食 50mL にてルートキープ
- ② (側管) グラニセトロンバッグ100mL 30分かけて点滴静注
- ④ (側管) 生食 50mL + オンコピン mg 全開点滴静注
- ⑤ (側管) 生食 50mL + ブレオ mg 30分にて点滴
- ⑥ (メイン) ①生食 50mL の残液にてルートフラッシュ

備考

エトポシド濃度は<0.4mg/mL以下にする	オンコピンはMAX2mg
ブレオ の総投与量に注意	