

乳腺外科-004

# <化学療法予約箋>

プロトコール名	FEC療法
病名	乳癌

プロトコール

薬品名	成分名	基準値	施行日	休薬
エピルビン	塩酸エピルビン	100 mg/m <sup>2</sup> /day	Day1	20日
5-FU	フルオウラシル	500 mg/m <sup>2</sup> /day		
エンドキサン	シクロフォスファミド	500 mg/m <sup>2</sup> /day		

<3週毎、6回で1クール>

	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目
施行日						
薬剤師						
看護師						

\*末梢から投与の場合、プロイメンドによる血管炎予防に生食250mlを同時に流す

## Day1

- ① (メイン) 生食 50ml にてルート確保 (点滴確保確認後、フラッシュ分残す)
- ② (側管) グラニセトロンバッグ3mg/100mL +プロイメンド1V+ オルガドロン 1.9mg×3A 60分
- ③ (側管) 生食 50ml + エピルビン 全開
- ④ (側管) 生食 100 ml + 5-FU 30分
- ⑤ (側管) 5%ブドウ糖 250ml + エンドキサン 1時間
- ⑥ ①の生食50mlの残液でフラッシュ (全開)

## Day2

内服 ; デカドロン 0.5mg 6錠/分3 3日分  
 カイトリル 1錠×3 嘔気時

備考

--