

# <化学療法予約箋>

プロトコール名	(2回目以降)パージェタ+トラスツズマブ+パクリタキセル療法
病名	乳癌

プロトコール

薬品名	成分名	基準値	施行日
パージェタ	ペルツズマブ	420 mg/day	Day1
トラスツズマブ	トラスツズマブ	6 mg/Kg/day	Day1
パクリタキセル	パクリタキセル	80 mg/m <sup>2</sup> /day	Day1,8,15

<3週間ごと>

	1回目			2回目		
	Day1	Day8	Day15	Day1	Day8	Day15
施行日						

**Day1**

- ① (メイン) 生食 50ml にてルート確保 (点滴挿入確認後、フラッシュ分残す)
- ② (側管) 生食 250ml + パージェタ ( ) 分 \* 投与時間確認  
**※初回投与に忍容性あれば30分まで短縮可能**
- ③ (側管) 生食 250ml + トラスツズマブ ( ) 分 \* 投与時間確認  
**※初回投与に忍容性あれば30分まで短縮可能**
- ④ (側管) グラニセトロンバッグ 100mL+オルガドロン (1.9mg) ×5A+ファモチジン (20mg) 1A 30分
- ⑤ レスタミン5T (内服後すぐ点滴スタート)  
**\*パクリタキセル15分前~フローズングローブ・ソックス装着**
- ⑥ (側管) 5%ブドウ糖液 250ml + パクリタキセル (1時間)  
 (0.22ミクロン以下のインラインフィルター使用 DEHP (可塑剤) フリーのルート使用)  
**\* 10分、30分、終了時観察**
- ⑥①の生食50mlの残液でフラッシュ (15分)  
**\* 生食終了後、フローズングローブ・ソックスはずす**

**Day8**

**Day15**

- ① レスタミン5T (内服後、すぐ点滴スタート)
- ② (メイン) 生食 50ml にてルート確保 (点滴挿入確認後、フラッシュ分残す)
- ③ (側管) グラニセトロンバッグ 100mL+オルガドロン (1.9mg) ×5A+ファモチジン (20mg) 1A 30分  
**\*パクリタキセル15分前~フローズングローブ・ソックス装着**
- ④ (側管) 5%ブドウ糖液 250ml + パクリタキセル (1時間)  
 (0.22ミクロン以下のインラインフィルター使用 DEHP (可塑剤) フリーのルート使用)  
**\* 10分、30分、終了時観察**
- ⑤ ①の生食50mlの残液でフラッシュ (15分)  
**\* 生食終了後、フローズングローブ・ソックスはずす**

備考