

<化学療法予約箋>

プロトコール名	テセントリク+nab-PTX
病名	乳癌

プロトコール

薬品名	成分名	基準値	施行日
テセントリク	アテゾリズマブ	840 mg/body	Day1,15
アブラキサン	アルブミン型パクリタキセル	100 mg/m2/day	Day1,8,15
<4週間>			

	day1	day8	day15	day1	day8	day15
施行日						

day1,15

①(メイン)生食 50ml にてルート確保 (点滴挿入確認後、点滴終了後のフラッシュ分残す)

②(側管)生食 250ml + テセントリク()分 *投与時間確認

* 初回60分で投与。初回60分投与の忍容性有れば、2回目以降の投与時間は30分まで短縮可能

※インラインフィルター (0.2または0.22 μ m) を使用すること

③(側管)生食50ml+オルガドロン1.9mg 2A(15分)

*アブラキサン投与15分前~フローズングローブ・ソックス装着

*アブラキサン フィルター使用不可 ロット入力必要

④(側管)生食(1Vあたり20mL)+アブラキサン (30分) *アブラキサンの量により総量 (ml) 違うので注意!

⑤ ①の生食50mLの残液でフラッシュ(15分)

*生食終了後、フローズングローブ・ソックスはずす

day8

①(メイン)生食 50ml にてルート確保 (点滴挿入確認後、点滴終了後のフラッシュ分残す)

②(側管)生食50ml+オルガドロン1.9mg 2A(15分)

*アブラキサン投与15分前~フローズングローブ・ソックス装着

*アブラキサン フィルター使用不可 ロット入力必要

③(側管)生食(1Vあたり20mL)+アブラキサン (30分) *アブラキサンの量により総量 (ml) 違うので注意!

④ ①の生食50mLの残液でフラッシュ(15分)

*生食終了後、フローズングローブ・ソックスはずす

備考

PD-L1測定すること