

プロトコール名	CBDCA + GEM
病名	卵巣癌

プロトコール

薬品名	成分名	基準値	施行日	休薬
ジェムザール	ゲムシタピン塩酸塩	1000 mg/m ² /day	DAY 1.8	13日
カルボプラチン	カルボプラチン	AUC= 4	DAY 1	
3週毎				

施行日	DAY1	DAY8
ジェムザール		
カルボプラチン		

ジェムザール投与時血管痛対策のため温罨法

DAY 1

- ①(メイン)生食50mL (ルート確保後フラッシュ分残す)
- ②(側管)グラニセトロンバック+ オルガドロン (1.9mg) 2A+プロイメンド1V (60分)
*末梢から投与の場合、プロイメンドによる血管炎予防に生食250mlを同時に流す
- ③(側管)5%TZ 250ml + カルボプラチン mg (60分)
- ④生食 100ml + ジェムザール mg (30分)
(必ず30分で滴下させること！)
- ⑤①(メイン)生食50mLの残液全開

DAY 8

- ①(メイン)生食50mL (ルート確保後フラッシュ分残す)
- ②(側管)生食100mL + オルガドロン (1.9mg) 4A (30分)
- ③(側管)生食 100ml + ジェムザール mg (30分)
(必ず30分で滴下させること！)
- ④①(メイン)生食50mLの残液全開

Day 8 は、WBC 2000未満、または血小板 7万未満であればスキップする。
DAY 2 に発熱が見られるが、38℃台ならクーリングで対応すること。
39℃以上ならボルタレン坐薬などの解熱剤を使用すること。

終了後はメイン全開

製剤 ジェムザール: 200,1000mg/V カルボプラチン: 50,150,450mg/V
備考

--