

婦人科34

<化学療法予約箋>

プロトコール名	可アルGEM + DTX 併用療法
病名	

プロトコール

薬品名	成分名	基準値	施行日	休薬
ドセタキセル	ドセタキセル	70 mg/m ² /day	DAY 8	13日
ジェムザール	ゲムシタビン塩酸塩	900 mg/m ² /day	DAY 1.8	
3週毎				

施行日	DAY1	DAY8
ドセタキセル		
ジェムザール		

ジェムザール投与時血管痛対策のため温罨法

DAY 1

- ①(メイン)生食50mL (ルート確保後、フラッシュ分残す)
- ②(側管) 生食100mL+ オルガドロン(1.9mg) 4A (30分)
- ③(側管)生食 100ml + ジェムザール mg (30分)
 <<ジェムザールは必ず30分で滴下させること>>
- ④①(メイン)生食50mLの残液全開

DAY 8 フロースングローブ・ソックス使用

- ①(メイン)生食50mL (ルート確保後フラッシュ分残す)
- ②(側管)グラニセトロンバック+ オルガドロン(1.9mg) 4A (30分)
 *ドセタキセル15分前~フロースングローブ・ソックス装着
- ③5%糖液 250ml + ドセタキセル mg (60分)
 *投与10分、30分、終了時観察
- ④生食 100ml + ジェムザール mg (30分)
 <<ジェムザールは必ず30分で滴下させること>>
 *ジェムザール開始15分後フロースングローブ・ソックスはずす
- ⑤①(メイン)生食50mLの残液全開

DAY8はWBC3000,好中球1500、血小板10万以上を投与基準とする

備考