

# 婦人科35

## <化学療法予約箋>

プロトコール名	TXL+CBDCA+BV(monthly)併用療法
病名	

プロトコール

薬品名	成分名	基準値	施行日	休薬
パクリタキセル	パクリタキセル	180 mg/m <sup>2</sup> /day	Day 1	20日
カルボプラチン	カルボプラチン	AUC = 5		
アバステン	ペバシズマブ	15 mg/kg/day		
3週毎				

	1回目
施行日	

フローズングローブ・ソックス使用

投与前日 入院時 血管確保

21:00 オルガドロン 20mg 静注 (オルガドロン19mg×1V+1.9mg×0.5A)

投与当日 5:00 生食500mL(70mL/h)

DEHP(可塑剤)フリー、0.22 μ m以下のインラインフィルター付きのルート使用

5:00 オルガドロン 20mg 静注 (オルガドロン19mg×1V+1.9mg×0.5A)

10:00 (メイン)5時～の生食残を150mL/hでプロイメンドと同時に流す

(側管)グラニセトロンバッグ+プロイメンド1V+ ファモチジン 20mg +ポララミン1A(60分)

パクリタキセル開始15分前からフローズングローブ・ソックス装着

11:00 (側管)生食 500ml + パクリタキセル mg

↓ 3時間 (11:00 11:05 11:10 11:15 11:30 12:00 14:00)バイタルチ

14:00 バイタルチェック

14:00 (側管)5%糖液250mL + カルボプラチン mg

↓ 1時間 カルボプラチン開始15分後フローズングローブ・ソックスはずす

15:00 (側管)生食 100ml + アバステン mg

↓

アバステンの点滴時間確認  
 ※初回90分で忍容性あれば、2回目60分、忍容性あれば  
 3回目30分まで短縮可能。以降の投与は30分

(メイン)生食500mLの残液翌朝までルートキープ

芍薬甘草湯 6g/分3 でパクリタキセル投与3日前より定期投薬(TJコース終了まで)

備考

--